



ИЗУМРУД.СТУДЕНТ
Информационно-методический ресурс



3303387125950

Проверочный лист

Заполняется участниками

Направление ☒ Естественные науки ☐ Инженерные науки
☐ Математика и информатика ☐ Социальные и
☐ Экономика и управление гуманитарные науки
Курс ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐ отсутствует
Город участия **Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г**

Заполняется организаторами

Количество доп. листов Количество черновиков к проверке :
Время выхода с до :

Протокол проверки

Заполняется жюри

Номер задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Балл члена жюри №1	0	60								
Балл члена жюри №2	0	60								
Номер задания	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Балл члена жюри №1										
Балл члена жюри №2										

Итоговый балл 60

Подпись члена жюри №1 Подпись члена жюри №2

Пример заполнения А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

10

Капорецептор – ацетилхолин. Его рецепторы – холинэргические – расположены на постсинаптической мембране тел нейрона или его дендритов, расположенных в коре головного мозга и в других его отделах, в сером веществе спинного мозга, а также в периферической нервной системе – в нервных ганглиях, в Телье холинэргические рецепторы расположены на постсинаптической мембране мышечного волокна нервно-мышечного соединения, на которых происходит эфферентной нервной импульс.

Эти рецепторы могут вызывать ВПС (возбуждающей постсинаптической потенциал), что активизирует нервные клетки или мышцу. Также они могут вызывать гиперполяризацию постсинаптической мембраны, что наоборот будет подавлять возмещение на ней потенциала действия, и/или рецепторы могут активировать естественные тормозные нейроны, которые будут тормозить следующие нервные клетки.

20

Они имеют близкие Ацетилхолин ингибируют формирование нормализации структуры ацетилхолина (холинэстеразы) и вызывают дефицит медиатора.

10

